



## КОНКУР, КС

Діюча речовина: метрибузин, 600 г/л

Препаративна форма: концентрат, що емульгується

Призначення: Селективний системний гербіцид широкого спектру для контролю широколистяних та злакових бур'янів

Спосіб застосування та норми витрат



Культура	Бур'яни	Норма витрати на 1 сотку	Спосіб обробки	Макс. кратність обробок
Соя	Однорічні дводольні та деякі злакові	5-7 мл на 2-3 л води	Обприскування ґрунту до появи сходів культури	1

### Світовий досвід застосування

Картопля	Однорічні дводольні та деякі злакові	5-11 мл на 2-3 л води	Обпр. ґрунту до появи сходів культури	1
		5 мл на 2-3 л води	Обпр. за висоти культури до 5-10см	1
Томати (розсадні) <sup>o</sup>	Однорічні дводольні та деякі злакові	5-7 мл на 2-3 л води	Обп. через 15-20 днів після висаджув. розсади	1
Томати (безрозсадні)	Однорічні дводольні та деякі злакові	5-7 мл на 2-3 л води	Обприскування у фазі 4-6 листків культури	1
Морква <sup>oo</sup>	Однорічні дводольні та деякі злакові	3-5 мл на 2-3 л води	Обприскування у фазу «олівця» культури	1

<sup>o</sup> не застосовувати препарат у теплицях

<sup>oo</sup> не застосовувати на ґрунтах із вмістом гумусу нижче 2 %

Строки виходу людей на оброблені площі для проведення механізованих робіт - 3 дні.

**Спектр дії:** в оптимальних нормах препарат забезпечує надійний контроль таких бур'янів: щиряця (види), волошка синя, лобода (види), калачики (види), рутка лікарська, льоник звичайний, жабрій звичайний, ромашка (види), гірчак (види), портулак городній, гірчиця польова, зірончик середній, куряче просо, лисохвіст мишохвостиковий, амброзія полинолиста, курячі очка польові, лутига розлога, грицики звичайні, дурман звичайний, кропива глуха (види), осот жовтий, кропива (види), фіалка польова, канатник Теофаста, падалиця соняшнику. Стійкі види: осот рожевий, берізка польова, підмаренник чіпкий, пірій повзучий, гумай, молочай (види).

**Приготування робочого розчину:** Робочий розчин готують безпосередньо перед застосуванням. Потрібну кількість препарату в залежності від площі, яку необхідно обробити, розвести в необхідній кількості води. **Швидкість дії:** видимі симптоми з'являються на 3-7 день, повна загибель через 10-21 день в залежності від видового складу та стадії розвитку бур'янів. Період захисної дії: в залежності від температури, типу і вологості ґрунту гербіцид забезпечує захист посівів до 6-8 тижнів.

**Заходи безпеки.** Всі роботи з препаратом проводити в індивідуальних засобах захисту. Під час роботи з гербіцидом забороняється палити, пити або вживати їжу. Після закінчення роботи зняти одяг і старанно вмити з милом обличчя та руки. Перша медична допомога. При попаданні препарату: в шлунок - необхідно у постраждалого викликати блювоту для повного видалення препарату з шлунку. Потім дати випити завись активованого вугілля (2-3 столові ложки на півсклянки води); в очі - промити великою кількістю води; на шкіру - ретельно видалити речовину марлевим тампоном, промити великою кількістю води з милом. **Зберігання:** зберігати в цілісній фабричній упаковці в недоступних для дітей місцях, окремо від харчових продуктів, за температури від 0°C до +35°C.

**Знешкодження препарату та знищення тари.** Випадково розлитий препарат засипати хлорним вапном або кальцинованою содою, потім зібрати. Забороняється зливати залишки препарату в каналізацію. Не допускати потрапляння у водойми залишків препарату, робочого розчину або тари. **Гарантійний термін зберігання:** 4 роки в неушкодженій фабричній тарі.

**Розробник та заявник:** ТОВ «Альфа Смарт Агро» м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 тел.: +38 (044)220 04 46

**Виробник:** PLATFORM AGROTECH CO., LTD.

**Фасувальник:** ПАТ «Київський завод «РІАП» для ТОВ «АГРОКС ПАК ПЛЮС» тел.: (044)482 41 54

**№ партії:**

**Дата виготовлення:**



# КОНКУР

## 100мл

ЗНИЩЕННЯ  
БУР'ЯНІВ

ГЕРБІЦИД

